

Ortiva Top 1 L



A small version of the Ortiva Top logo, consisting of the green leaf icon and the text "Ortiva Top" in a smaller font size, positioned above a thin green horizontal line.

Ortiva Top 1 L

Calificación: Sin calificación

Precio:

Modificador de variación de precio:

PVP

Precio con descuento: 92,00 €

Precio de venta con descuento:

PVP Final 92,00 €

Ahorras

Cantidad de impuestos:

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Características / Modo de acción

ORTIVA TOP es un fungicida de aplicación foliar a base de Azoxistrobin y Difenconazol para el control de

enfermedades fúngicas en tomate, pimiento, berenjena, fresa, judía verde, lechuga y alcachofa.

El Azoxistrobin es un potente inhibidor de la germinación de esporas, presentando acción preventiva, curativa y

erradicante, con propiedades de contacto y translaminares.

El Difenconazol es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa que es absorbido por la planta y tiene

una gran translocación acrópeta, basípeta y translaminar.

Composición

Azoxistrobin 20 % p/v (200 g/l) + Difenconazol 12,5% p/v (125 g/l)

Contiene 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-35-5) con hidróxido sódico (CAS 1310-73-2)

Recomendaciones de uso

LMR Difenconazol

2 mg/kg

0,4 mg/kg

20 mg/kg (en hojas)

0,4 mg/kg (en fruto)

0,5 mg/kg

3 mg/kg

1 mg/kg

0,15 mg/kg

CULTIVO APLICACIÓN RECOMENDADA

Tomate Mildiu, Aire libre
Oídio, Alternaria, Colaspas, Botrytis

100

Debe ser aplicado en pulverización foliar a alta presión,

Berenjena manua
l o me
diante
tractor.

ml/hl

(max.

1 l/ha)

Fresa Oídio,
Alternaria, Cladosporiosis

Max 3

trat./ca

mpaña

Interva

lo

entre a

plicaci

ones

de

7-10

días

Pimie Mildiu,

nto Oídio,
Altern
aria, C
ladosp
oriosis

100

ml/hl

(max.

1 l/ha)

Max 2

trat./ca

mpaña

Interva

lo

entre a

plicaci

ones

de

7-10

días

Lechuga Mildiu, Aire libre, Alternaria, Etnoderma, Sclerotinia

100

Debe ser aplicado en pulverización foliar a alta presión, manual o mediante tractor.

ml/hl

(max.

1 l/ha)

Max 3

trat./ca

mpaña

Interva

lo

entre a

plicaci

ones

de

7-10

días

Judía Oidio,
verde Roya

100

ml/hl

(max.

1 l/ha)

Max 2

trat./ca

mpaña

Interva

lo

entre a

plicaci

ones

de

10-12

días

Alcac Oídio
hofa

100

ml/hl

(max.

1 l/ha)

Max 3

trat./ca

mpaña

Interva

lo

entre a

plicaci

ones

de

7-10

días

CULTI PLAZ

LMR A

VO	O DE	zoxistr
	SEGU	obin
	RIDAD	
Tomate	3 días	3
e		mg/kg